

EVAIA XC512 (сутки 1-3), XC516 (сутки 21-23) (европейский протокол) Саркома Юинга, ПНЭО

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
22-24	Актиномицин D	0,5**	-	0	Болюс	внутривенно
1, 22	Винкристин	1,5(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1-3	Доксорубицин	20	0,9% NaCl	250 мл	4 часа	внутривенно
1-3, 22-24	Ифосфамид	2000	0,9% NaCl	1000 мл	1 час	внутривенно
1-4, 22-25	Месна	2000	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно
1-3, 22-24	Этопозид	150	0,9% NaCl	1000 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Актиномицин D																														
Винкристин																														
Доксорубицин																														
Ифосфамид																														
Месна																														
Этопозид																														

Дополнительная информация

Примечание:

Если общая доза составляет ≥ 200 мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.

(*) Винкристин, макс. количество доз - 2 мг.

(**) Актиномицин D, макс. кол-во доз - 1 мг.

Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе ≥ 500 мг/м².

Месна: 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4, 8 часов после приема Ифосфамида. Обратите внимание!

Месна (Mesna). Производится ЦПФ «Хемотека» только в стеклянных флаконах. Минимальный заказ - от 15 флаконов. Возможно приготовление в дозах 300-2000 мг во флаконе.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Schmoll H.-J. et al., Kompendium Internistische Oncology, Springer, S. 2128, 1999.

ПОВТОРНО НА:
43 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2