

Винорелбин (перорально) ХА149 (европейский протокол) - Часть 1 Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Винорелбин	60	-	0	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8
Винорелбин							

Дополнительная информация

Примечание:

В случае нейтропении (один раз при 4 степени по ВОЗ или два раза при 3 степени по ВОЗ):

- В течение первых трех недель после начала лечения сохранять дозу 60 мг/м²/неделя.
- (*) В течение следующих недель снижать дозу с 80 мг/м²/неделя до 60 мг/м²/неделя. Смотрите - Винорелбин (перорально) ХА149 (европейский протокол) - Часть 2.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Jassem J. et al., Ann Oncol 12: 1375ff, 2001.

ПОВТОРНО НА:
8 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
3

