

SYVADIC (EORTC) XC376 (европейский протокол) Саркома мягких тканей

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 5	Винкристин	1(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1-5	Дакарбазин	250	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1	Доксорубицин	50	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно
1	Циклофосфамид	500	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Винкристин																					
Дакарбазин																					
Доксорубицин																					
Циклофосфамид																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Месна: 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Циклофосфамида (перорально или внутривенно).

(*) Винкристин, макс. 2 мг.

Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе ≥ 500 мг/м².

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Gottlieb J.A. et al., Cancer Chemother Res 58: 265ff, 1974.