

Паклитаксел / Топотекан / Бевацизумаб ХС836 + ХА060 (европейский протокол) Рак шейки матки

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Бевацизумаб	10 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 минут	внутривенно
1	Паклитаксел	175	0,9% NaCl	500 мл	3 часа	внутривенно
1-3	Топотекан	0,75	0,9% NaCl	50 мл	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Бевацизумаб																					
Паклитаксел																					
Топотекан																					

Дополнительная информация

Примечание:

Паклитаксел разводят до 0,3-1,2 мг/мл.

Сопутствующая медикация до Паклитаксела:

Дексаметазон, 20 мг внутривенно за 30 минут до

Паклитаксела или Дексаметазона - 20 мг орально за 6 и 12 часов до Паклитаксела. Рекомендована дополнительная премедикация 50 мг Ранитидина и 30 мг Дифенгидрамина. Топотекан разводят до 0,025-0,05 мг/мл.

(*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Tewari K.S. et al., N Engl J Med 370: 734ff, 2014.

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

