

Ритуксимаб ХА090 (европейский протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарствен ное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворите ль	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500 мл	5 часов (3 часа)	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8
Ритуксимаб							

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
8 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
4

Примечание:

Ритуксимаб: Начальная скорость инфузий - 50 мг/ч; через 30 минут ее можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Дальнейшие дозы вводятся на начальной скорости 100 и увеличиваются на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.

Всего рекомендованы 4 цикла.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Maloney D. et al., Blood 90: 2188ff, 1997.

