

Флударабин / Циклофосфамид / Ритуксимаб ХС552 + ХА090 (европейский протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Ритуксимаб	500*	0,9% NaCl	500 мл	5 часов (3 часа)	внутривенно
1-3	Флударабин	25	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно
1-3	Циклофосфамид	250	0,9% NaCl	500 мл	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ритуксимаб																												
Флударабин																												
Циклофосфамид																												

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:

(*) Ритуксимаб: Начальная скорость инфузий - 50 мг/ч; через 30 минут ее можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Дальнейшие дозы вводятся на начальной скорости 100 и увеличиваются на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.

Внимание! Синдром распада опухоли и нарушения функции Т-лимфоцитов.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Hallek M. et al., Lancet 376: 1164ff, 2010.