

ABVD XC024 (европейский протокол) Ходжкинская лимфома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 15	Блеомицин	10	-	0	болюс	внутривенно
1, 15	Винбластин	6	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1, 15	Дакарбазин	375	0,9% NaCl	500 мл	30 минут	внутривенно
1, 15	Доксорубицин	25	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Блеомицин																												
Винбластин																												
Дакарбазин																												
Доксорубицин																												

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:

Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе ≥ 500 мг/м.

Дакарбазин: обязательно инфузионная система в светонепроницаемых контейнерах.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Santoro A. et al., Cancer Chemother Pharmacol 2: 101ff, 1979.