

Базовая ВЕАСОРР ХС144 (сутки 1-3); ХА149 (сутки 8) (европейский протокол) Ходжкинская лимфома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
8	Блеомицин	10	-	0	болюс	внутривенно
8	Винкристин	1,4(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1	Доксорубицин	25	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно
1-14	Преднизон	40	-	0	-	перорально
1-7	Прокарбазин	100	-	0	-	перорально
1	Циклофосфамид	650	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1-3	Этопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Блеомицин																				
Винкристин																				
Доксорубицин																				
Преднизон																				
Прокарбазин																				
Циклофосфамид																				
Этопозид																				

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
21 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:

Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе ≥ 500 мг/м².

Если общая доза составляет ≥ 200 мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.

(*) Винкристин, макс. 2 мг.

Месна: 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Циклофосфамида (перорально или внутривенно).

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Diehl V. et al., Ann Oncol 8: 143ff, 1997.