

Карбоплатин / Паклитаксел (локальный протокол) Рак легких

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	30 минут	внутривенно
1	Паклитаксел	200	0,9% NaCl	500 мл	3 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Карбоплатин																					
Паклитаксел																					

Дополнительная информация

Примечание:

Паклитаксел разводят до 0,3-1,2 мг/мл.

Сопутствующая медикация до Паклитаксела:

Премедикация: Дексаметазон, 20 мг внутривенно за 30 минут до Паклитаксела или Дексаметазона - 20 мг орально за 12 и 6 часов до Паклитаксела.

Рекомендована дополнительная премедикация 50 мг Ранитидина и 30 мг Дифенгидрамина.

Разведенные растворы Паклитаксела вводят через инфузионные системы без ПВХ.

Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):

Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).

Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по МКБ -10 - с 33, с 34.

Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

Литература:

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

