

ЕСФ: Цисплатин / Флюороурацил / Эпирубицин (локальный протокол) Опухоли желудочно-кишечного тракта

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-21	Флюороурацил	200	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно
1	Цисплатин	60	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно
1	Эпирубицин	50	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Флюороурацил																					
Цисплатин																					
Эпирубицин																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Внимание! Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общем количестве доз ≥ 1000 мг/м².

Цисплатин (только если СКФ ≥ 60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO₄ внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Авторство: [Национальный институт рака](#)