

Карфилзомиб / Леналидомид / Дексаметазон ХА149 (европейский протокол) Множественная миелома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22	Дексаметазон	40	-	0	-	перорально
1, 2, 8, 9, 15, 16	Карфилзомиб	20*	5% Глюкоза	250 мл	30 минут	внутривенно
1-21	Леналидомид	25 мг (const)	-	0	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Дексаметазон																												
Карфилзомиб																												
Леналидомид																												

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:

Карфилзомиб назначают с начальной дозой 20 мг/м² в первом цикле на первые и вторые сутки. При хорошей переносимости дозу увеличивают до 27 мг/м² на 8-е сутки 1 цикла.

До начала 1 цикла необходима надлежащая гидратация, особенно у пациентов с высоким риском синдрома распада опухоли или нефротоксичности.

Рекомендована профилактика образования тромбов.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Stewart A.K. et al., N Engl J Med 372: 142ff, 2015.

