

MINE ± R (локальний протокол) Ходжкінська лимфома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-3	Ифосфамид	1330	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно
1-3	Месна	1330	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно
1	Митоксантрон	8	0,9% NaCl	100 мл	1 час	внутривенно
1-3	Этопозид	65	0,9% NaCl	500 мл	2 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ифосфамид																					
Месна																					
Митоксантрон																					
Этопозид																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Нозология - рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.

Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака.

Цель - предоставление диагностической и лечебной помощи больным с рецидивом лимфом в Национальном институте рака.

Важно - Месна вводить по схеме, затем 500 мг/сут в/венно, начиная через 4 часов после окончания инфузии ифосфамида, 1-3 день.

Авторство: [Национальный институт рака](#)