

IVEG ± R (локальний протокол) Ходжкінська лимфома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Винорелбин	20	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1,4	Гемцитабин	800	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно
1-4	Ифосфамид	2000	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1-4	Преднизолон	100 мг (const)	-	-	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Винорелбин																					
Гемцитабин																					
Ифосфамид																					
Преднизолон																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Нозология - рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.

Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака.

Важно - Месна (Mesna) 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4 - 8 ч. после приема Ифосфамида.

Авторство: [Национальный институт рака](#)