

Паклитаксел / Карбоплатин / Флюороурацил (локальний протокол) Рак голови и шеи

Дни терапии	Лекарствен ное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворите ль	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	1 час	внутривенно
1	Паклитаксел	175	0,9% NaCl	500 мл	3 часа	внутривенно
3-5	Флюороурац ил	1000	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Карбоплатин																					
Паклитаксел																					
Флюороурацил																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
5

Примечание:

Локальный протокол медицинской помощи
больных на:

- рак губы;
- рак ротовой полости;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхнечелюстной пазухи;
- рак слюнных желез.

Протокол предназначен для отделения опухолей
головы и шеи, отделение лучевой терапии и
отделение химиотерапии солидных опухолей
Национального института рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)