

Метотрексат / Блеомицин / Цисплатин (локальный протокол) Рак головы и шеи

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Блеомицин	10	-	-	болеус	внутривенно
1, 15	Метотрексат	40	0,9% NaCl	100 мл	15 минут	внутривенно
1	Цисплатин	50	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Блеомицин																					
Метотрексат																					
Цисплатин																					

Дополнительная информация

Примечание:

Локальный протокол медицинской помощи больных на:

- рак губы;
- рак ротовой полости;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхнечелюстной пазухи;
- рак слюнных желез.

Протокол предназначен для отделения опухолей головы и шеи, отделение лучевой терапии и отделение химиотерапии солидных опухолей Национального института рака.

Важно! Проводится при низко- и недифференцированных формах рака, рецидивирующего и/или метастазирующего рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
5

