

Анагрелид ХА149 (европейский протокол) Другие хронические миелопролиферативные заболевания

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-30	Анагрелид	4 x 0,5 (const)	-	0	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Анагрелид																														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
31 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
постоянный прием

Примечание:

* Постоянный прием.

Начинают терапию с 0,5 мг/сутки в течение недели, затем дозу увеличивают еженедельно на 0,5 мг/сутки до достижения желаемого терапевтического эффекта. Общая предусмотренная доза в сутки распределяется на 2 раза (каждые 12 ч) или 3 раза (каждые 8 ч). Препарат с дозировкой, превышающей 5 мг/сутки не применяется.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Petitt R.M. et al., Semin Hematol 34: 51ff, 1997.

