

НАВ-паклитаксел / Карбоплатин ХС774 (европейский протокол) Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

Дни терапии	Лекарствен ное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворите ль	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	НАВ- паклитаксел	100	-	0	30 минут	внутривенно
1	Карбоплати н	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
НАВ-паклитаксел																					
Карбоплатин																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):

Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Socinski M.A. et al., J Clin Oncol 30: 2055ff, 2012.

