

Капецитабин + Бевацизумаб ХА060 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Бевацизумаб	15 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 минут	внутривенно
1-14	Капецитабин	2000	-	0	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Бевацизумаб																					
Капецитабин																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Капецитабин: 2000 мг/м² разделяют на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю, через 30 минут после приема пищи.

Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Robert J.N. et al., J Clin Oncol 29: 1252ff, 2011.

