

Лапатиниб + Трастузумаб ХА110 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-21	Лапатиниб	4 x 250	-	84 шт	-	перорально
1	Трастузумаб	6* мг/кг	0,9% NaCl	250 мл	90 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Лапатиниб																					
Трастузумаб																					

Дополнительная информация

Примечание:

Лапатиниб - длительный прием.

Трастузумаб, сутки 22.

(*) Фиксированная нагружающая доза"

Трастузумаба - 8 мг/кг, со скоростью первого введения в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 30 минут.

Трастузумаб можно также назначать подкожно в постоянной дозе 600 мг/5 мл.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Blackwell K.L. et al., J Clin Oncol 28: 1124ff, 2010;
Ismael G. et al., Lancet Oncol 13: 869ff, 2012.

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

