

## Етопозид / Цисплатин ХС304 (європейський протокол) Нейроендокринна пухлина/рак

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2, 3        | Цисплатин        | 45                           | 0,9% NaCl | 1000 мл         | 24 години    | внутрішньовенно |
| 1, 2, 3     | Етопозид         | 130                          | 0,9% NaCl | 1000 мл         | 24 години    | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| <b>Цисплатин</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Етопозид</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Якщо загальна доза становить  $\geq 200$  мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% розчині NaCl.

Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Moertel C.G. et al., Cancer 68: 227ff, 1991.

