

Хлорамбуцил / Обінутузумаб ХА076 (європейський протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	Обінутузумаб	1000 мг (const)	0,9% NaCl	500 мл	-	внутрішньовенно
1, 15	Хлорамбуцил	0,5 мг/кг	-	0	**	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Обінутузумаб																												
Хлорамбуцил																												

Додаткова інформація

Примітка:

(*) Обінутузумаб лише в 1-шу добу, починаючи з 2 циклу і далі.

(**) Обінутузумаб, 1-й цикл.

Доба 1: 100 мг; введення зі швидкістю 25 мг/год протягом 4 год.

Доба 2: 900 мг; введення зі швидкістю 50 мг/год; швидкість інфузії можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год.

Доба 8, 15: Ведення інфузії розпочинається зі швидкістю 100 мг/год та збільшується на 100 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год.

Рекомендується премедикація - 30 мг

Дифенгідраміну.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Goede V. et al., N Engl J Med 370: 1011ff, 2014.

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

