

## Ібрутініб ХА149 (європейський протокол) НХЛ хронічна

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| 1-30        | Ібрутініб        | 420 (const)                  | -         | 0               | -            | перорально    |

### Графік введення препаратів:

|           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ібрутініб |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
31 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
постійний прийом

Повторно: \* Постійний прийом.

Примітка:

Для лікування лімфоми з клітин мантийної зони  
рекомендована доза - 560 мг/д.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016.

Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е  
видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Byrd J.C. et al., N Engl J Med 371: 213ff, 2014;

Wang M.L. et al., N Engl J Med 369: 507ff, 2013.

