

Карбоплатин / Паклітаксел (локальний протокол) Рак легень

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1	Паклітаксел	200	0,9% NaCl	500 мл	3 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Карбоплатин																					
Паклітаксел																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Паклітаксел розводять до 0,3-1,2 мг/мл.

Супутня медикація до Паклітакселю:

Премедикація: Дексаметазон, 20 мг внутрішньовенно за 30 хвилин до Паклітакселю або Дексаметазону - 20 мг орально за 12 та за 6 годин до Паклітакселю.

Рекомендована додаткова премедикація 50 мг Ранітидину та 30 мг Дифенгідраміну.

Розведені розчини Паклітакселю вводять через інфузійні системи без ПВХ.

Розрахунок дози Карбоплатину (формула Calvert):

Доза (мг) = цільова AUC x (ШКФ + 25).

Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за мкх-10 - с 33, с 34.

Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

Література:

Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.

