

Бортезоміб / Талідомід / Дексаметазон ХА020 (європейський протокол) Множинна мієлома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 4, 8, 11	Бортезоміб	1,3	-	0	-	підшкірно
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	Дексаметазон	40 (const)	-	0	-	перорально
1-21	Талідомід	100 мг (const)	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Бортезоміб																					
Дексаметазон																					
Талідомід																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
3

Повторно: Доба 22 (*) - тривалий прийом.

Кількість циклів: 3.

Примітка:

(**) 100 мг талідоміду щодоби протягом перших 14 днів, потім по 200 мг Талідоміду щодоби.

Рекомендована профілактика утворення тромбів.

Концентрація Бортезомібу - 2,5 мг/мл.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетная терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Cavo M. et al., Lancet 376: 2075ff, 2010.