

Циклофосфамід / Доксорубіцин / Етопозид (локальний протокол) Дрібноклітинний рак легень - ДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Доксорубіцин	45	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	1000	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно
1-3	Етопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Доксорубіцин																												
Циклофосфамід																												
Етопозид																												

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній дозі ≥ 500 мг/м².

Месна: 20% дози Циклофосфаміду внутрішньовенно або орально через 0, 4, 8 годин після прийому Циклофосфаміду. Належний діурез.

Якщо загальна доза становить ≥ 200 мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% NaCl.

Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за мкх-10 - с 33, с 34.

Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

Література:

Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.