

Модифікація XELOX: Цисплатин / Капецитабін (локальний протокол) Пухлини шлунково-кишкового тракту

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-14	Капецитабін	1000	-	-	-	перорально
1	Цисплатин	60	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Капецитабін																					
Цисплатин																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Капецитабін 1000 мг/м² розділяють на 2 рівні дози - ранкову та вечірню, через 30 хвилин після прийому їжі.

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

