

Карфілзоміб / Дексаметазон ХА149 (європейський протокол) Множинна мієлома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	Дексаметазон	20 (const)	-	0	-	перорально
1, 2, 8, 9, 15, 16	Карфілзоміб	20*	5% Глюкоза	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Дексаметазон																												
Карфілзоміб																												

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:

Карфілзоміб призначають з початковою дозою 20 мг/м² у першому циклі на першу та другу добу. При добрій переносимості дозу збільшують до 56 мг/м² на 8-му добу 1 циклу.

До початку 1 циклу необхідна належна гідратація, особливо у пацієнтів з високим ризиком синдрому розпаду пухлини або нефротоксичності.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Dimopoulos M.A. et al., J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr. 8509).