

Іксазоміб / Леналідомід / Дексаметазон ХА149 (європейський протокол) Множинна мієлома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22	Дексаметазон	40	-	0	-	перорально
1, 8, 15	Іксазоміб	4 (const)	-	0	-	перорально
1-21	Леналідомід	25 (const)	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Дексаметазон																												
Іксазоміб																												
Леналідомід																												

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:

Іксазоміб зараз також наявний за програмою застосування незареєстрованого препарату при важкій патології.

Рекомендована профілактика утворення тромбів.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Moreau P. et al., Blood 126, 2015 (abstr. 727).