

Панобіностат / Бортезоміб / Дексаметазон ХА149 (європейський протокол) Множинна мієлома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 4, 8, 11	Бортезоміб	1,3	-	0	-	підшкірно
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	Дексаметазон	20 (const)	-	0	-	перорально
1, 3, 5, 8, 10, 12	Панобіностат	20 мг (const)	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Бортезоміб																					
Дексаметазон																					
Панобіностат																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
12

Примітка:

Наприкінці першої фази лікування (тобто восьми тритижневих циклів), пацієнти, у яких відбулося покращення, можуть перейти до другої фази лікування (чотири 6-тижневі цикли), протягом якого призначають Панобіностад за такою самою схемою, однак Бортезоміб призначається один раз на тиждень на 1, 2, 4 та 5 тижнях, а Дексаметазон - у ті самі та наступні дні після Бортезомібу.

Концентрація Бортезомібу - 2,5 мг/мл.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

San-Miguel J.F. et al., Lancet Oncol 15: 1195ff, 2014.