

Циклофосфамід / Доксорубіцин / Вінкристин / Цисплатин (локальний протокол) Рак голови та шиї

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Вінкристин	1	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1	Доксорубіцин	30	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	800	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
4	Цисплатин	100	0,9% NaCl	500 мл	2 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Вінкристин																					
Доксорубіцин																					
Циклофосфамід																					
Цисплатин																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
5

Примітка:

Локальний протокол медичної допомоги хворих на:

- рак губи;
- рак ротової порожнини;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхньощелепної пазухи;
- рак слинних залоз.

Протокол призначений для відділення пухлин голови та шиї, відділення променевої терапії та відділення хіміотерапії солідних пухлин Національного інституту раку.

Важливо! Протокол проводиться при низько- та недиференційованих формах раку.

Месна (Mesna) 20% дози Циклофосфаміду, через 0, 4 та 8 год. після прийому Циклофосфаміду.

Авторство: [Національний інститут раку](#)