

Пеметрексед ХС800 (європейський протокол) Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Пеметрексед	500	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Пеметрексед																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

За 1-3 тижні до початку терапії Пеметрекседом:

- Заміщення із застосуванням 350 - 1000 мкг фолієвої кислоти перорально щодоби до 3 тижнів після завершення терапії.

- Заміщення вітаміном В12: 1000 мкг в/м (один раз на 9 тижнів) до 3 тижнів після завершення терапії.

- Оральний прийом Дексаметазону - 8 мг перорально щодоби протягом 3 діб, починаючи за 1 день до початку прийому Пеметрекседу.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Hanna N. et al., J Clin Oncol 22: 1589ff, 2004.

