

Цисплатин / Пеметрексед ХС326 (європейський протокол) Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Пеметрексед	500	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1	Цисплатин	75	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Пеметрексед																					
Цисплатин																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

За 1-3 тижні до початку терапії Пеметрекседом:

- Заміщення із застосуванням 350 - 1000 мкг фолієвої кислоти перорально щодоби до 3 тижнів після завершення терапії.

- Заміщення вітаміном B12: 1000 мкг в/м (один раз на 9 тижнів) до 3 тижнів після завершення терапії.

- Оральний прийом Дексаметазону - 8 мг перорально щодоби протягом 3 діб, починаючи за 1 день до початку прийому Пеметрекседу.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Scagliotti G.V. et al., J Clin Oncol 26: 3543ff, 2008.

