

Оксаліплатин / Ралтитрексид ХС760 (європейський протокол) Мезотеліома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Оксаліплатин	130	5% Глюкоза	500 мл	2 години	внутрішньовенно
1	Ралтітрексид	3	0,9% NaCl	100 мл	15 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Оксаліплатин																					
Ралтітрексид																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
4

Примітка:

Увага! Оксаліплатин приймають через 1 годину після Ралтітрексиду.

У разі настання нейротоксичності (2 ступеня), тривалість інфузії Оксаліплатину продовжують до 4-6 годин.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Fizazi K. et al., J Clin Oncol 18: 2293ff, 2000.

