

Епірубін / Доцетаксел ХС424 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Епірубін	75	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Доцетаксел																					
Епірубін																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

Увага! Епірубін може бути кардіотоксичним при загальній дозі ≥ 1000 мг/м².

Супутня медикація:

Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Bonneterre J., Br J Cancer 91: 1466ff, 2004.

