

Трастузумаб-Емтанзин ХА112 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Трастузумаб - Емтазін	3,6 мг/кг	0,9% NaCl	250 мл	90 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Трастузумаб - Емтазін																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
12

Примітка:

Перше введення Трастузумабу - Емтазину - протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості, наступні дози можна вводити протягом 30 хвилин.

Введення лише із застосуванням вбудованого фільтра.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Verna S. et al., N Engl J Med 367: 1783ff, 2012.

