

Название схемы: Цисплатин / Пеметрексед ХС326 (европейский протокол)**Действующее вещество:** Пеметрексед, Цисплатин**Данные о пациенте:****Рост** 0 см**Вес** 0 кг**Площадь поверхности тела** 0 м2

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения | Стоимость, грн |
|-------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Пеметрексед Испания | 0 | 0,9% NaCl | 100 мл | 10 минут | внутривенно | 0,00 |
| 1 | Цисплатин Германия | 0 | 0,9% NaCl | 1000 мл | 2 часа | внутривенно | 0,00 |

Общая стоимость: 0,00 грн**График введения препаратов:**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Пеметрексед | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цисплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**Примечание:**Цисплатин (только если СКФ ≥ 60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO₄ внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

За 1-3 недели до начала терапии Пеметрекседом:

- Замещение с использованием 350-1000 мкг фолиевой кислоты перорально каждые сутки до 3-х недель после завершения терапии.

- Замещение витамином B12: 1000 мкг в/м (раз в 9 недель) до 3 недель после завершения терапии.

- Оральный прием Дексаметазона - 8 мг перорально каждые сутки в течение 3 суток, начиная за 1 день до начала приема Пеметрекседа.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.**Литература:**

Scagliotti G.V. et al., J Clin Oncol 26: 3543ff, 2008.

Сопутствующая терапия, пре- и постмедикация:

| № | Наименование | Номенклатура | Количество (единиц) | Стоимость, грн |
|---|---|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 0,9% раствор NaCl (100 мл) | Флаконы 100 мл №1 | 5 | 92,55 |
| 2 | 0,9% раствор NaCl (1000 мл) | Контейнер 1000 мл №1 (Bottle Pack) | 5 | 319,75 |
| 3 | 0,9% раствор NaCl 500 мл + KCl 10 мЭкв | Контейнер 500 мл №1 | 5 | 0,00 |
| 4 | 0,9% раствор NaCl 500 мл + KCl 10 мЭкв + MgSO ₄ 8 мЭкв | Контейнер 500 мл №1 | 4 | 0,00 |
| 5 | Витамин B12 | Ампулы 0,2 мг/мл 1 мл №10 | 5 | 0,00 |
| 6 | Дексаметазон | Ампулы 2 мг/мл 1 мл №10 | 5 | 0,00 |
| 7 | Дексаметазон | Ампулы 4 мг/мл 1 мл №10 | 1 | 0,00 |

| | | | | |
|----|----------------|--------------------------|---|----------|
| 8 | Димедрол | Таблетки 30 мг №10 | 1 | 0,00 |
| 9 | Маннитол 20% | Флаконы 200 мл №1 | 1 | 78,49 |
| 10 | Ондансетрон | Ампулы 2,0 мг/мл 4 мл №5 | 5 | 1 023,40 |
| 11 | Ранитидин | Ампулы 25 мг/мл 2 мл №10 | 4 | 0,00 |
| 12 | Фолиевая к-та | Таблетки 1 мг №30 | 1 | 0,00 |
| 13 | Ципрофлоксацин | Флаконы 2 мг/мл 200 мл | 1 | 55,42 |

Общая стоимость: 1 569,61 грн

Сопутствующие системы введения:

| № | Наименование | Количество (единиц) | Стоимость, грн |
|----|--|---------------------|----------------|
| 1 | Бинт 5 м x 10 см марлевый стерильный, тип 17 | 1 | 4,32 |
| 2 | Катетер 20-22 | 1 | 0,00 |
| 3 | Катетер 20-22 на несколько портов | 1 | 0,00 |
| 4 | Перчатки хирургические стерильные неприпудренные, размер 7,5 | 3 | 50,91 |
| 5 | Пластырь катушечный тканевая основа 1.25 x 500 | 3 | 26,22 |
| 6 | С-ма для в/в без ПВХ | 1 | 0,00 |
| 7 | С-ма для в/в без ПВХ и алюминия | 6 | 0,00 |
| 8 | Салфетки спиртовые | 4 | 0,00 |
| 9 | Шприц 10 мл с 2 иглами | 4 | 13,44 |
| 10 | Шприц 2 мл с 2 иглами | 2 | 4,16 |

Общая стоимость: 99,05 грн

Общая стоимость лечения , грн

1 668,66

