

## 5FU / Цисплатин ХС284 (европейський протокол) Рак пищевода

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-5	Флюороурацил	1000	0,9% NaCl	1000	24 часа	внутривенно
1	Цисплатин	100	0,9% NaCl	500	2 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Флюороурацил</b>																												
■	■	■	■	■																								
<b>Цисплатин</b>																												
■																												

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

#### Примечание:

**Цисплатин (только если СКФ ≥ 60 мл/мин.):**

**Сопутствующая медикация:**

**Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.**

**200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.**

**Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.**

**Литература:**

(\* Bleiberg H. et al., Eur J Cancer 33: 1216ff, 1997),  
Kelsen D.P. et al., N Engl J Med 339: 1979ff, 1998.

