

## ЕОХ ХС490 (европейский протокол) Рак желудка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-21	Капецитабин	1250	-	0	-	перорально
1	Оксалиплатин	130	5% Глюкоза	500	2 часа	внутривенно
1	Эпирубицин	50	0,9% NaCl	250	30 минут	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Капецитабин</b>																					
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Оксалиплатин</b>																					
■																					
<b>Эпирубицин</b>																					
■																					

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

#### Примечание:

**Внимание! Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общей дозе  $\geq 1000$  мг/м<sup>2</sup>. Капецитабин: 1250 мг/м<sup>2</sup> разделяют на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю, через 30 минут после приема пищи.**

#### Обратите внимание!

• Капецитабин (Capecitabini). Капсулы. Дозировки ЦПФ «Хемотека»: 150 мг, 250 мг, 500 мг. Количество капсул в упаковке: 60 шт., 120 шт. Возможно изготовление индивидуального количества капсул в упаковке.

#### Литература:

Cunningham D. et al., N Engl J Med 358: 36ff, 2008.

