

ЕОХ ХС490 (европейский протокол) Рак желудка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-21	Капецитабин	1250	-	0	-	перорально
1	Оксалиплатин	130	5% Глюкоза	500	2 часа	внутривенно
1	Эпирубицин	50	0,9% NaCl	250	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Капецитабин																					
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Оксалиплатин																					
■																					
Эпирубицин																					
■																					

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

Внимание! Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общей дозе ≥ 1000 мг/м². Капецитабин: 1250 мг/м² разделяют на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю, через 30 минут после приема пищи.

Обратите внимание!

• Капецитабин (Capecitabini). Капсулы. Дозировки ЦПФ «Хемотека»: 150 мг, 250 мг, 500 мг. Количество капсул в упаковке: 60 шт., 120 шт. Возможно изготовление индивидуального количества капсул в упаковке.

Литература:

Cunningham D. et al., N Engl J Med 358: 36ff, 2008.

