ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

5FU / Лейковорин / Оксалиплатин (FLO) XC752 (европейский протокол) Рак желудка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно
1	Оксалиплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутривенно
1	Флюороурацил	2600	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кальция фолинат															
Оксалиплатин															
Флюороурацил															

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
15 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
12

Примечание:
Количество циклов: пока заболевание прогрессирует.
(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.
Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.
Литература:
Al-Batran S.E. et al., J Clin Oncol 26: 1435ff, 2008.