chemoteka.com



5FU / Лейковорин / Оксалиплатин / Доцетаксел (FLOT) XC412 (европейский протокол) Рак желудка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м²	Растворитель	Объем (мл/ шт)	Время введения	Путь введения	
1	Доцетаксел	50	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно	
1	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно	
1	Оксалиплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутривенно	
1	Флюороурацил	2600	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно	

График введения препаратов:

Трафик введения пренаратов.														
1	2	m	4	72	9	7	∞	6	10	11	12	13	14	15
Доцетаксел												!		
Кальция фолинат														
Оксал	Оксалиплатин													
Флюороурацил												-		
				•										

Дополнительная информация

повторно на: **15 (день)**

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:

Примечание:

(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом. Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

Сопутствующая медикация:

Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Al-Batran S.E. et al., Ann Oncol 19: 1882ff, 2008.

