

## 5FU / Лейковорин / Оксалиплатин / Доцетаксел (FLOT) ХС412 (европейский протокол) Рак желудка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Доцетаксел	50	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно
1	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно
1	Оксалиплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутривенно
1	Флюороурацил	2600	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Доцетаксел</b>														
<b>Кальция фолинат</b>														
<b>Оксалиплатин</b>														
<b>Флюороурацил</b>														

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
15 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

(\*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

#### Сопутствующая медикация:

Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Al-Batran S.E. et al., Ann Oncol 19: 1882ff, 2008.

