chemoteka.com



Паклитаксел / Рамуцирумаб XA149 (европейский протокол) Рак желудка

Дни терапии	Лекарственн ое средство	Дозировка, мг/м²	Растворител ь	Объем (мл/ шт)	Время введения	Путь введения		
1, 8, 15	Паклитаксел	80	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно		
1, 15	Рамуцирумаб	8 мг/кг	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно		

График введения препаратов:

1	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	56	27	28	29
Паклитаксел																												
Рамуцирумаб																												

Дополнительная информация

Примечание:

Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.

Рамуцирумаб также можно применять в монотерапии. Паклитаксел разводят до 0,3-1,2 мг/мл.

Сопутствующая медикация Паклитаксела:

Дексаметазон, 20 мг внутривенно за 30 минут до Паклитаксела или Дексаметазон - 20 мг орально за 6 и 12 часов до Паклитаксела. Рекомендована дополнительная премедикация 50 мг Ранитидина и 30 мг Дифенгидрамина.

Разведенные растворы Паклитаксела вводят через инфузионные системы без ПВХ.

Авторы: <u>Thomas Kühr</u>, <u>Ewald Wöll</u>, <u>Josef Thaler</u> (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г. Литература:

Wilke H.J. et al., Lancet Oncol 15: 1224ff, 2014; Fuchs C.S. et al., Lancet 383: 31ff, 2014.

повторно на: 29 (день)

количество циклов: 6

