ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Паклитаксел / Рамуцирумаб XA149 (европейский протокол) Рак желудка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Паклитаксел	80	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно
1, 15	Рамуцирумаб	8 мг/кг	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Паклитаксел																													
	■							■							■														
Рамуцирумаб																													
	■														■														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:
Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.
Рамуцирумаб также можно применять в монотерапии.
Паклитаксел разводят до 0,3-1,2 мг/мл.
Сопутствующая медикация Паклитаксела: Дексаметазон, 20 мг внутривенно за 30 минут до Паклитаксела или Дексаметазон - 20 мг орально за 6 и 12 часов до Паклитаксела. Рекомендована дополнительная премедикация 50 мг Ранитидина и 30 мг Дифенгидрамина.
Разведенные растворы Паклитаксела вводят через инфузионные системы без ПВХ.
Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.
Литература:
Wilke H.J. et al., Lancet Oncol 15: 1224ff, 2014; Fuchs C.S. et al., Lancet 383: 31ff, 2014.