

## Паклитаксел / Рамуцирумаб ХА149 (европейский протокол) Рак желудка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Паклитаксел	80	0,9% NaCl	250	1 час	внутривенно
1, 15	Рамуцирумаб	8 мг/кг	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Паклитаксел</b>																												
■							■							■														
<b>Рамуцирумаб</b>																												
■														■														

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.

Рамуцирумаб также можно применять в монотерапии.

Паклитаксел разводят до 0,3-1,2 мг/мл.

Сопутствующая медикация Паклитаксела:

Дексаметазон, 20 мг внутривенно за 30 минут до Паклитаксела или Дексаметазон - 20 мг орально за 6 и 12 часов до Паклитаксела. Рекомендована дополнительная премедикация 50 мг Ранитидина и 30 мг Дифенгидрамина.

Разведенные растворы Паклитаксела вводят через инфузионные системы без ПВХ.

Литература:

Wilke H.J. et al., Lancet Oncol 15: 1224ff, 2014;

Fuchs C.S. et al., Lancet 383: 31ff, 2014.

