

Гемцитабин ХС592 (европейский протокол) Рак поджелудочной железы и холангиоцеллюлярная карцинома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22, 29, 35, 43	Гемцитабин	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Гемцитабин																															

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
50 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Первый цикл следует прекратить раньше в случае негематологической токсичности ≥ 2 степени или ≥ 3 степени гематологической токсичности;

затем на 1, 8 и 15 сутки, с повтором на 29 сутки.

Количество циклов: 6 (1 цикл - 7 недель).

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Burriss H.A. et al., J Clin Oncol 15: 2403ff, 1997.

