

# НАВ-паклитаксел / Гемцитабин ХС595 (европейський протокол) Рак піджелудочної желези і холангіоцеллюлярна карцинома

Дни терапії	Лекарственне средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	НАВ-паклитаксел	125	-	0	30 минут	внутривенно
1, 8, 15	Гемцитабин	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>НАВ-паклитаксел</b>																												
■							■							■														
<b>Гемцитабин</b>																												
■							■							■														

## Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)  
(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Von Hoff D.D. et al., N Engl J Med 369: 1691ff, 2013.

