

НАВ-паклитаксел / Гемцитабин ХС595 (европейський протокол) Рак піджелудочної желези і холангіоцеллюлярна карцинома

Дни терапії	Лекарствен- ное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворите- ль	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	НАВ- паклитаксел	125	-	0	30 минут	внутривенно
1, 8, 15	Гемцитабин	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
НАВ-паклитаксел																												
█							█							█														
Гемцитабин																												
█							█							█														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(руководство «Протоколы химиотерапии 2016.
Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е
издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016
г.

Литература:

Von Hoff D.D. et al., N Engl J Med 369: 1691ff, 2013.

