

# Гемцитабин / Капецитабин ХС592 (европейский протокол) Рак поджелудочной железы и холангиоцеллюлярная карцинома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Гемцитабин	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно
1-21	Капецитабин	1660	-	0	-	перорально

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Гемцитабин</b>																												
<b>Капецитабин</b>																												

## Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
2**

### Примечание:

Капецитабин: 1660 мг/м<sup>2</sup> разделяют на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю, через 30 минут после приема пищи.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

### Литература:

Cunningham D. et al., J Clin Oncol 27: 5513ff, 2009.

