

Гемцитабин / Эрлотиниб ХС592 (европейский протокол) Рак поджелудочной железы и холангиоцеллюлярная карцинома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Гемцитабин	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно
1-28	Эрлотиниб	100 (const)	-	0	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Гемцитабин																												
■							■							■														
Эрлотиниб																												
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2**

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Moore M.J., J Clin Oncol 25: 1960ff, 2007.

